

إذا كنت تبدأ PLENVU® في صباح تنظير القولون الخاص بك،
إليك كيفية التحضير

موقع تنظير القولون: _____

تاريخ تنظير القولون: _____ / _____ / _____

لا شيء للشرب بعد: _____ صباحا/مساء

وقت تنظير القولون: _____ صباحا/مساء

صباح تنظير القولون

الجرعة 2 PLENVU®:

التاريخ: _____ / _____ / _____

يوم الأسبوع: أ، ث، أر، خ، ج، س، أ

الوقت: _____ ص/م

الجرعة 1 PLENVU®:

التاريخ: _____ / _____ / _____

يوم الأسبوع: أ، ث، أر، خ، ج، س، أ

الوقت: _____ ص



حافظ على رطوبتك!

من المهم أن تشرب السوائل
الصالبة قبل وأثناء وبعد التحضير.

صباح

جرعة 2

جاهز للإجراء

16 أونصة (473 مليلتر) أونس (236 مليلتر)

16 أونصة (473 مليلتر) مليلتر (236 مليلتر)

نكهة قوار الفواكه

جرعة 1

انتظر على الأقل ساعتين من بداية الجرعة 1

16 أونصة (473 مليلتر) مليلتر (236 مليلتر)

16 أونصة (473 مليلتر) مليلتر (236 مليلتر)

نكهة المانجو

ملاحظة: الحل الفعلي واضح.

توقف عن شرب السوائل على الأقل ساعتين قبل تنظير القولون الخاص بك
أو على النحو الموصى به من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

خذ الجرعة 1

1. استخدم وعاء الخلط لمزج محتويات كيس الجرعة 1 مع 16 أونصة على الأقل من الماء بالخفق أو باستخدام ملعقة حتى تذوب تمامًا. قد يستغرق هذا من 2 إلى 3 دقائق. خذ وقتك- أنهى ببطء الجرعة في غضون 30 دقيقة.

2. أعد ملء الحاوية بما لا يقل عن 16 أونصة (473 مليلتر) من السائل الخفيف. مرة أخرى، خذ وقتك وأنهى كل شيء ببطء في غضون 30 دقيقة.

انتظر على الأقل ساعتان من بداية الجرعة 1 ، ثم ...

خذ الجرعة 2

1. استخدم وعاء الخلط لمزج محتويات الجرعة 2 (الكيس أ والكيس ب) مع 16 أونصة (473 مليلتر) على الأقل من الماء بالخفق أو باستخدام ملعقة حتى تذوب تمامًا. قد يستغرق هذا من 2 إلى 3 دقائق. خذ وقتك- أنهى ببطء الجرعة في غضون 30 دقيقة.

2. أعد ملء الحاوية بما لا يقل عن 16 أونصة (473 مليلتر) من السائل الخفيف. مرة أخرى، خذ وقتك وأنهى كل شيء ببطء في غضون 30 دقيقة.

* يشار إلى "نظام الجرعات الصباحية ليوم واحد" (كما هو مذكور في معلومات وصف الأدوية) باسم "جرعة نفس اليوم من التنظير القولوني".

نصيحة مفيدة: PLENVU® يمكن تبريده. استخدمه في غضون 6 ساعات بعد مزجه بالماء

دواعي الاستعمال

PLENVU® (البولي إيثيلين جلايكول 3350، أسكوريبات الصوديوم، كبريتات الصوديوم، حمض الأسكوربيك، كلوريد الصوديوم، وكلوريد البوتاسيوم) للمحلول الفمي) هو دواء موصوف يستخدمه الكبار لتنظيف القولون قبل تنظير القولون.

معلومات هامة للسلامة

الرجاء الاطلاع على معلومات السلامة المهمة على ظهر الصفحة ومعلومات الوصفات الطبية الكاملة المصاحبة لها، بما في ذلك دليل الاستطباب وتعليمات الاستخدام.

• لا تأخذ PLENVU® إذا كان لديك انسداد في أمعائك (انسداد أمعاء)، فتحة في جدار المعدة أو الأمعاء

ابق رطبًا لنجاح التحضير

من المهم أن تبقى رطبًا قبل وأثناء وبعد أخذ PLENVU®.

لا تحتاج إلى شرب الماء فقط - يمكنك أن تختار من السوائل الصافية. تتضمن أمثلة السوائل الصافية ما يلي:

- صودا صافية
- شوربة مرق صافية
- عصير الليمون المصفى أو الليموناضة
- عصير فواكه خفيف معصور (بدون لب)
- جيلاتين (بدون فاكهة أو كريمة)
- المصاصات (بدون قطع من الفاكهة أو اللب)
- المشروبات الرياضية
- القهوة / الشاي (بدون الحليب)

لا تشرب الكحول أو الحليب أو السوائل ذات اللون الأحمر أو الأرجواني أو أي شيء يحتوي على اللب.

توقف عن شرب السوائل على الأقل ساعتين قبل تنظيف القولون الخاص بك أو على النحو الموصى به من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

لمزيد من المعلومات حول PLENVU®، قم بزيارة myPLENVU.com أو اتصل على الخط الساخن المجاني على مدار 24 ساعة 1-855-MY-PLENVU

معلومات هامة للسلامة (تتمة)

- حامل أو تخططين للحمل.

- تقومين بالرضاعة الطبيعية أو تخططين لقيام بالرضاعة الطبيعية.

• قد يؤثر PLENVU® على كيفية عمل الأدوية الأخرى. أخبر طبيبك عن جميع الأدوية الأخرى (بما في ذلك الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية والفيتامينات والمكملات العشبية) التي تأخذها قبل تناول PLENVU®. لا تتناول الأدوية القوية خلال ساعة واحدة قبل أو بعد البدء في كل جرعة من PLENVU®.

• أعراض الحساسية الخطيرة قد تشمل طفحًا جلديًا، حكة، بقعًا حمراء مرتفعة على جلدك (خلايا النحل)، تورمًا في الوجه، الشفتين، اللسان، والحنجرة، ومشكلات في الكلى.

• في الدراسات السريرية مع PLENVU®، كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا في المرضى الذين يتناولون PLENVU® هي الغثيان والقيء والجفاف وآلام البطن / عدم الراحة.

نحن نشجعك على الإبلاغ عن الآثار الجانبية السلبية للأدوية الموصوفة إلى إدارة الأغذية والعقاقير. تفضل بزيارة www.fda.gov/medwatch أو اتصل بـ 1-800-FDA-1088.

للحصول على معلومات حول المنتج، وتقارير عن الأحداث العكسية، وتقارير شكوى حول المنتجات، يرجى الاتصال بـ:

مركز الاتصال لمعلومات منتج Salix

هاتف: 1-800-321-4576

فاكس: 1-510-595-8183

البريد الإلكتروني: salixmc@dss.com

الرجاء الاطلاع على معلومات السلامة المهمة في الصفحة ومعلومات الوصفات الطبية الكاملة المصاحبة لها، بما في ذلك دليل الاستطباب وتعليمات الاستخدام.

• من المهم شرب سوائل صافية كافية قبل وأثناء وبعد استخدام PLENVU®. تأكد من استهلاك سوائل صافية إضافية بعد الجرعة الأولى والجرعة الثانية من PLENVU®. توقف عن شرب السوائل ساعتان 2 قبل تنظيف القولون.

• قبل تناول PLENVU®، تحدث مع طبيبك إذا كنت:

- لديك مشكلات في خسارة خطيرة في سوائل الجسم (الجفاف) والتغيرات في أملاح الدم (الكهارل).

- لديك مشكلات في القلب أو تتناول الدواء الذي يؤثر على قلبك. قد يفكر طبيبك في إجراء اختبار تخطيط القلب الكهربائي (ECG) إذا كنت في خطر متزايد للإصابة بشبهات ضربات القلب.

- لديك تاريخ من النوبات أو تتناول دواء مضاد نوبات.

- لديك مشكلات في الكلى أو تتناول الدواء الذي يؤثر على وظائف الكلى. قد يرغب طبيبك في إجراء اختبار الدم قبل وبعد تنظيف القولون.

- لديك تاريخ من مشكلات في المعدة أو الأمعاء، مثل التهاب القولون التقرحي، انسداد الأمعاء، أو فتح مشنته في جدار المعدة أو الأمعاء.

- لديك مشكلات في البلع، حرقة (ارتداد المعدة)، أو إذا كنت تستنشق الغذاء أو السوائل في رئتيك عند تناول الطعام أو الشرب (ارتشاف).

- لديك حالة تدمر خلايا الدم الحمراء، وتسمى نقص الجلوكوز-6-فوسفات ديهيدروجينيز (G6PD).

- تسحب من شرب الكحول.

- لديك بيلة فينيل كيتون (PKU). يحتوي PLENVU® على الأسبارتام بما يعادل 491 ملغ من الفينيل ألانين لكل علاج.

