



Pauta posológica dividida en 2 días

Si empieza a tomar PLENVU® la noche antes de su colonoscopia, **aquí le explicamos cómo prepararse**

Fecha de la colonoscopia: _____ / _____ / _____ Lugar de la colonoscopia: _____

Hora de la colonoscopia: _____ No se debe beber nada después de: _____

NOCHE

Dosis 1 de PLENVU®:

Fecha: _____ / _____ / _____

Día de la semana: L M X J V S D

Hora: _____

MAÑANA

Dosis 2 de PLENVU®:

Fecha: _____ / _____ / _____

Día de la semana: L M X J V S D

Hora: _____

NOCHE	MAÑANA
DOSIS 1 SABOR A MANGO	DOSIS 2 ESPERE APROXIMADAMENTE 12 HORAS DESDE EL COMIENZO DE LA DOSIS 1 SABOR A ZUMO DE FRUTAS LISTO PARA EL PROCEDIMIENTO

Nota: la solución real es clara.

Deje de beber líquidos al menos 2 horas antes de la colonoscopia o según lo recomendado por su proveedor de asistencia sanitaria.



TOME LA DOSIS 1

1. Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido del sobre de la dosis 1 con al menos 16 onzas líquidas (473 ml) de agua agitándolo todo o usando una cuchara hasta que se disuelva por completo. Esto puede tardar de 2 a 3 minutos. Tómese su tiempo: termine lentamente la dosis en 30 minutos.
2. Vuelva a llenar el recipiente con al menos 16 onzas líquidas (473 ml) de líquido transparente. De nuevo, tómese su tiempo y térmelo lentamente en 30 minutos.

ESPERE APROXIMADAMENTE 12 HORAS DESDE EL COMIENZO DE LA DOSIS 1, Y ENTONCES...

TOME LA DOSIS 2

1. Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la dosis 2 (sobre A y sobre B) con al menos 473 ml de agua agitándolo o usando una cuchara hasta que se disuelva por completo. Esto puede tardar de 2 a 3 minutos. Tómese su tiempo: termine lentamente la dosis en 30 minutos.
2. Vuelva a llenar el recipiente con al menos 16 onzas líquidas (473 ml) de líquido transparente. De nuevo, tómese su tiempo y térmelo lentamente en 30 minutos.

CONSEJO ÚTIL: PLENVU® puede refrigerarse. Úselo en las 6 horas posteriores a mezclarlo con agua.

INDICACIÓN

PLENVU® (polietilenglicol 3350, ascorbato de sodio, sulfato de sodio, ácido ascórbico, cloruro de sodio y cloruro de potasio para solución oral) es un medicamento recetado que los adultos usan para limpiar el colon antes de una colonoscopia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- No tome PLENVU® si tiene un bloqueo en su intestino (obstrucción

intestinal), una abertura en la pared del estómago o el intestino (perforación intestinal), problemas con el vaciado de alimentos o líquidos del estómago (retención gástrica), un problema de desplazamiento demasiado lento de la comida a través de sus intestinos (íleo), un intestino grueso muy dilatado o alergia a alguno de los ingredientes de PLENVU®.

Consulte la información importante de seguridad adicional de la parte posterior y toda la información de prescripción adjunta, que incluye la guía de medicamentos y las instrucciones de uso.

Manténgase hidratado/a para que la preparación tenga éxito

Es importante mantenerse hidratado/a antes, durante y después de la ingesta de PLENVU®.

No es necesario que beba solo agua; puede optar por líquidos claros. Algunos ejemplos de líquidos claros son estos:

- Gaseosa clara
- Sopas claras de caldo
- Limonada o bebida de lima filtrada
- Gelatina (sin frutas ni coberturas)
- Bebidas energéticas
- Zumo de fruta claro diluido (sin pulpa)
- Café/té (sin leche)
- Polos (sin trozos de fruta ni pulpa)

No tome alcohol, leche, líquidos de color rojo o morado ni nada que contenga pulpa.

Deje de beber líquidos al menos 2 horas antes de la colonoscopia o según lo recomendado por su proveedor de asistencia sanitaria.

Para obtener más información sobre **PLENVU®**,
visite **myPLENVU.com** o llame a nuestra línea gratuita
de 24 horas al teléfono **1-855-MY-PLENVU**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- Es importante beber suficiente líquido claro antes, durante y después del uso de PLENVU®. Asegúrese de consumir otros líquidos claros después de la primera dosis y la segunda dosis de PLENVU®. Deje de beber líquidos 2 horas antes de la colonoscopia.
- Antes de tomar PLENVU®, hable con su médico si:
 - Tiene problemas con la pérdida grave de líquidos corporales (deshidratación) y cambios en las sales de la sangre (electrolitos).
 - Tiene problemas cardíacos o toma medicamentos que afecten al corazón. Su médico puede plantearse hacer un electrocardiograma (ECG) si tiene un mayor riesgo de anomalías en el ritmo cardíaco.
 - Tiene un historial de convulsiones o toma medicamentos anticonvulsivos.
 - Tiene problemas renales o toma medicamentos que afecten a la función renal. Es posible que su médico quiera realizar análisis de sangre antes y después de la colonoscopia.
 - Tiene antecedentes de problemas estomacales o intestinales, como colitis ulcerativa, bloqueo intestinal o una posible abertura en la pared del estómago o el intestino.
 - Tiene problemas para tragar, acidez estomacal (reflujo gástrico) o si inhala alimentos o líquidos en sus pulmones al comer o beber (aspirar).
 - Sufre una afección que destruye los glóbulos rojos, llamada deficiencia de 6-fosfato de glucosa deshidrogenasa (G6PD).
 - Está dejando el alcohol.
 - Tiene fenilcetonuria (PKU). PLENVU® contiene aspartamo equivalente a 491 mg de fenilalanina por cada tratamiento.

- Está embarazada o planea quedarse embarazada.
- Está amamantando o planea amamantar.
- PLENVU® puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos. Antes de tomar PLENVU®, informe a su médico de todos los demás medicamentos (incluidos los medicamentos con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas) que tome. No tome medicamentos por vía oral en la hora anterior o posterior al inicio de cada dosis de PLENVU®.
- Los síntomas de reacciones alérgicas graves pueden incluir erupción cutánea, picazón, manchas rojas hinchadas en la piel (urticaria), hinchazón de la cara, los labios, la lengua y la garganta, y problemas renales.
- En estudios clínicos con PLENVU®, los efectos secundarios más frecuentes en pacientes que tomaban PLENVU® fueron náuseas, vómitos, deshidratación y dolor/malestar abdominal.

Se recomienda informar a la FDA de los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Para obtener información sobre productos, informes de eventos adversos e informes de quejas de productos, póngase en contacto con:

Salix Product Information Call Center

Teléfono: 1-800-321-4576

Fax: 1-510-595-8183

Correo electrónico: salixmc@dls.com

Consulte la información importante de seguridad adicional de la parte delantera y toda la información de prescripción adjunta, que incluye la guía de medicamentos y las instrucciones de uso.

