

Si vous commencez PLENVU<sup>®</sup> le matin de votre coloscopie,  
**voici comment procéder**

Date de la coloscopie : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Lieu de la coloscopie : \_\_\_\_\_

Heure de la coloscopie : \_\_\_\_\_ MATIN/SOIR Ne rien boire après : \_\_\_\_\_ MATIN/SOIR

## MATIN DE LA COLOSCOPIE

### PLENVU<sup>®</sup> Dose 1 :

Date : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Jour de la semaine : L Ma Me J V S D

Heure : \_\_\_\_\_ MATIN

### PLENVU<sup>®</sup> Dose 2 :


Date : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Jour de la semaine : L Ma Me J V S D

Heure : \_\_\_\_\_ MATIN/SOIR

### MATIN


#### DOSE 1



GOÛT MANGUE

ATTENDEZ AU MOINS  
**2 HEURES**  
APRÈS LE DÉBUT  
DE LA DOSE 1

#### DOSE 2



GOÛT FRUITÉ

PRÊT POUR  
L'EXAMEN

Remarque : la solution elle-même est incolore.

**Arrêtez de boire des liquides au moins 2 heures avant votre coloscopie**  
ou tel que recommandé par votre professionnel de la santé.

### PRENEZ LA DOSE 1

- Utilisez le récipient mélangeur pour mélanger le contenu du sachet de la Dose 1 avec au moins 16 onces (450 ml) d'eau en secouant ou en utilisant une cuillère jusqu'à dissolution complète. Cela peut prendre 2 à 3 minutes. Prenez votre temps-buvez lentement la dose dans les 30 minutes.
- Remplissez le récipient avec au moins 16 onces (450 ml) de liquide clair. Encore une fois, prenez votre temps et buvez-le lentement dans les 30 minutes.

### ATTENDEZ AU MOINS 2 HEURES APRÈS LE DÉBUT DE LA DOSE 1, PUIS ...

### PRENEZ LA DOSE 2

- Utilisez le récipient mélangeur pour mélanger le contenu de la Dose 2 (Sachet A et Sachet B) avec au moins 16 onces (450 ml) d'eau en secouant ou en utilisant une cuillère jusqu'à dissolution complète. Cela peut prendre 2 à 3 minutes. Prenez votre temps-buvez lentement la dose dans les 30 minutes.
- Remplissez le récipient avec au moins 16 onces (450 ml) de liquide clair. Encore une fois, prenez votre temps et buvez-le lentement dans les 30 minutes.

\*Le « schéma posologique d'une seule matinée » (tel qu'indiqué sur les informations posologiques) est appelé « schéma posologique du matin même de la coloscopie ».

**CONSEIL UTILE : PLENVU<sup>®</sup> peut être réfrigéré. Utiliser dans les 6 heures après l'avoir mélangé avec de l'eau.**

### INDICATION

PLENVU<sup>®</sup> (polyéthylène glycol 3350, ascorbate de sodium, sulfate de sodium, acide ascorbique, chlorure de sodium et chlorure de potassium pour solution buvable) est un médicament sur ordonnance utilisé chez l'adulte pour nettoyer le côlon avant une coloscopie.

### INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• Ne prenez pas PLENVU<sup>®</sup> si vous avez un blocage de l'intestin (obstruction

intestinale), une ouverture dans la paroi de l'estomac ou de l'intestin (perforation intestinale), des problèmes de vidange de l'estomac (rétention gastrique), des aliments qui se déplacent trop lentement dans l'intestin (occlusion intestinale), un gros intestin très dilaté ou une allergie à l'un des ingrédients de PLENVU<sup>®</sup>.

**Consultez au verso les Informations de sécurité importantes, ainsi que les Informations posologiques complètes jointes, y compris le Guide du médicament et le Mode d'emploi.**



### Restez hydraté !

Il est important de boire des liquides clairs avant, pendant et après votre préparation.

# Restez hydraté pour réussir votre préparation

## Il est important de rester hydraté avant, pendant et après la prise de PLENVU®.

Vous n'êtes pas obligé de ne boire que de l'eau - vous pouvez choisir parmi divers liquides clairs. Voici des exemples de liquides clairs :

- Soda clair
- Bouillons clairs
- Limonade de citron ou de citron vert filtrée
- Gélatine (sans fruits ni nappages)
- Boissons pour sportifs
- Jus de fruit clair et dilué dans de l'eau (sans pulpe)
- Café/thé (sans lait)
- Sucettes glacées (sans morceaux de fruits ou pulpe)

**Ne buvez pas d'alcool, de lait, de liquides de couleur rouge ou violette, ni de produit contenant de la pulpe.**

**Arrêtez complètement de boire au moins 2 heures avant votre coloscopie** ou tel que recommandé par votre professionnel de la santé.

Pour plus d'informations sur PLENVU®, visitez [myPLENVU.com](http://myPLENVU.com) ou appelez notre ligne d'assistance téléphonique gratuite 24 heures sur 24 à **1-855-MY-PLENVU**

### INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

- Il est important de boire suffisamment de liquides clairs avant, pendant et après la prise de PLENVU®. Assurez-vous de consommer des liquides clairs supplémentaires après les première et deuxième doses de PLENVU®. Arrêtez complètement de boire 2 heures avant la coloscopie.
  - Avant de prendre PLENVU®, informez votre médecin si vous :
    - Avez des problèmes de perte grave de liquide corporel (déshydratation) et des modifications des sels sanguins (électrolytes).
    - Avez des problèmes cardiaques ou prenez des médicaments qui affectent votre cœur. Votre médecin pourrait envisager d'effectuer un électrocardiogramme (ECG) si vous présentez un risque accru d'anomalies du rythme cardiaque.
    - Avez des antécédents de crises épileptiques ou prenez des médicaments contre les crises épileptiques.
    - Avez des problèmes rénaux ou prenez des médicaments qui affectent la fonction rénale. Votre médecin voudra peut-être effectuer des analyses sanguines avant et après votre coloscopie.
    - Avez des antécédents de problèmes d'estomac ou d'intestin, tels qu'une colite ulcéreuse, un blocage intestinal ou une ouverture présumée dans la paroi de l'estomac ou de l'intestin.
    - Avez des problèmes de déglutition, des brûlures d'estomac (reflux gastrique) ou inhalez de la nourriture ou des liquides dans vos poumons lorsque vous mangez ou buvez (aspirez).
    - Avez une maladie qui détruit les globules rouges, appelée déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD).
    - Êtes en plein sevrage alcoolique.
    - Souffrez de phénylcétonurie (PCU). PLENVU® contient de l'aspartame équivalent à 491 mg de phénylalanine par traitement.
  - Êtes enceinte ou prévoyez de l'être.
  - Allaites ou prévoyez d'allaiter.
  - PLENVU® peut affecter le fonctionnement d'autres médicaments. Informez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez (sur ordonnance ou en vente libre, ainsi que les vitamines et les suppléments à base de plantes) avant de prendre PLENVU®. Ne prenez pas de médicaments par voie orale une heure avant ou après le début de chaque dose de PLENVU®.
  - Les symptômes de réactions allergiques graves peuvent inclure des éruptions cutanées, des démangeaisons, des rougeurs sur la peau (urticaire), un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge ainsi que des problèmes rénaux.
  - Dans les études cliniques sur PLENVU®, les effets indésirables les plus fréquents chez les patients prenant PLENVU® étaient des nausées, des vomissements, une déshydratation et une douleur/gêne abdominale.
- Vous êtes encouragé à signaler les effets secondaires négatifs des médicaments sur ordonnance à la FDA. Visitez [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) ou appelez le 1-800-FDA-1088.
- Pour obtenir des informations sur les produits, des rapports sur les événements indésirables et des rapports sur les réclamations concernant les produits, veuillez contacter :
- Centre d'appel Salix Product Information  
Téléphone : 1-800-321-4576  
Fax : 1-510-595-8183  
E-mail : [salixmc@dlss.com](mailto:salixmc@dlss.com)
- Consultez au recto les Informations de sécurité importantes, ainsi que les Informations posologiques complètes jointes, y compris le Guide du médicament et le Mode d'emploi.**



